

Einfache Anwendung: 1x tgl. (abends), für max. 12 Wochen

1. Schonende Reinigung der Haut mit seifenfreien Syndets, anschließend vorsichtig trocken tupfen.
2. Clienzo dünn auf die betroffenen Hautareale auftragen, anschließend die Hände waschen.

Weitere praktische Hinweise

- Zu Behandlungsbeginn sind leichte Hautreizungen möglich, die üblicherweise im weiteren Verlauf nachlassen.
- Bei abschälender Haut kann ein feuchtigkeitsspendendes, nicht-komedogenes Pflegeprodukt helfen.
- Bei trockener und seborrhöischer Haut (z.B. Neurodermitis) sollte **Clienzo** mit Vorsicht angewendet werden, da eine weitere Austrocknung der Haut auftreten kann.
- BPO kann farbige Textilien oder Haare bleichen. Der Kontakt sollte vermieden werden. Es empfiehlt sich bei Anwendung von **Clienzo** am Abend die Verwendung von weißer / alter Wäsche (Handtücher, Kleidung, Bettwäsche).
- BPO kann eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung auslösen. Die ausgedehnte Exposition (Sonnenlicht, Solarium) sollte vermieden oder begrenzt werden (inkl. Sonnenschutz/schützende Kleidung).
- **Clienzo** bis zum Anbruch bei 2–8°C lagern, anschließend bei max. 25°C.



Clienzo 10 mg/g + 50 mg/g Gel

PZN 5501215

Tube 30 g

Diese Broschüre ist nur für Fachkreise bestimmt.

1 Nast et al. *J EADV* 2016, 30 (8), 1261-1268. **2** NICE-Guideline 2021 Acne vulgaris: management. **3** Seidler, Kimball. *J Am Acad Dermatol* 2010, 63 (1), 52-62. **4** Xu et al. *J EADV* 2016, 30 (7), 1176-1182. **5** Lookingbill et al. *J Am Acad Dermatol* 1997, 37 (4), 590-595. **6** Cunliffe et al. *Clin Ther* 2002, 24 (7), 1117-1133. **7** Leyden et al. *Am J Clin Dermatol* 2001, 2 (1), 33-39. **8** Tschen et al. *Cutis* 2001, 67 (2), 165-169. **9** Karoglan, Gollnick. *Hautarzt* 2021, 72 (8), 815-827. **10** Spižek, Rezanka. *Biochem Pharmacol* 2017, 133 (6), 20-28. **11** Sagransky et al. *Exp Opin Pharmacother* 2009, 10 (15), 2555-2562. **12** Tanghetti, Popp. *Dermatol Clin* 2009, 27 (1), 17-24. **13** Dréno. *Drugs* 2004, 64, 2389-2397. **14** Langner et al. *Br J Dermatol* 2008, 158 (1), 122-129. **15** Langner et al. *J EADV* 2007, 21 (3), 311-319. **16** Jackson et al. *J Drugs Dermatol* 2010, 9 (2), 131-136. **17** Zouboulis et al. *Cutis* 2009, 84 (4), 223-229. **18** Gonzalez et al. *J Cosmet Dermatol* 2012, 11 (12), 251-260. **19** Green et al. *J Clin Aesthet Dermatol* 2012, 5 (5), 16-24.

Clienzo 10 mg/g + 50 mg/g Gel. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 g Gel enthält 10 mg Clindamycin als Clindamycin-2-dihydrogenphosphat u. 50 mg Benzoylperoxid als wasserhaltiges Benzoylperoxid. **Sonstige Bestandteile:** Carbomer 980, Dimeticon, 3-Dodecylloxycarbonyl-2/3-sulfopropansäure-Dinatriumsalz, Natriumedetat (Ph.-Eur.), Glycerol (E 422), Poloxamer 182, Siliciumdioxid-Hydrat, Natriumhydroxid-Lösung 2N, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur topischen Behandlung der leichten bis mittelschweren Akne vulgaris, insb. mit entzündlichen Läsionen bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lincomycin oder einen der sonstigen Bestandteile. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Aknemittel; Antiinfektiva zur Behandlung der Akne. **ATC-Code:** D10AF51. **Packungsgrößen:** 30 g. **Inhaber der Zulassung:** INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim. **Rezept- und apothekenpflichtig.** Stand 06/2021. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

Vertrieb: InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Straße 1 · D-64646 Heppenheim.

Kontakt: InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2 / 1. Stock / Stiege 2 · 1190 Wien
Telefon 01/227 60 65-6060 · Fax 01/227 60 65-6061
www.infectopharm.at · austria.kontakt@infectopharm.com

Leitlinienempfohlene
Kombinationstherapie^{1,2}

Grüne
BOX



Clindamycin +
Benzoylperoxid

Clienzo®

Akne überspring' ich

- Einfache First-line-Therapie mit höchster Evidenz^{1,2}
- Bewährte Fixkombination mit Synergieprinzip³⁻⁸
- Ganz einfach: 1 x täglich abends

 **INFECTOPHARM**
Wissen wirkt.

CLIENZO®

10 mg/g + 50 mg/g Gel

Erfolgreich gegen Akne



Einsatz eines multimodalen Therapiekonzeptes gegen die vier wesentlichen Pathogenesefaktoren bei Akne vulgaris⁹

Intelligente Fixkombination mit synergistischem Wirkprinzip³⁻⁸

Clindamycinphosphat 1 %¹⁰

- **Pro-Drug:** Clindamycinphosphat wird in der Haut enzymatisch zum wirksamen Clindamycin aktiviert
- **antibakteriell:** Reduktion von *Propionibacterium acnes* (Syn.: *Cutibacterium acnes*)
- **antientzündlich:** Reduktion pro-inflammatorischer Mediatoren



Benzoylperoxid (BPO) 5 %^{11,12}

- **sebostatisch:** Unterbindung der übermäßigen Talgproduktion
- **keratolytisch:** gegen Komedonen in allen Stadien, Öffnung verhornter Poren
- **antimikrobiell:** Freisetzung bakterizid wirksamer reaktiver Sauerstoff-Spezies

Akne-Therapie mit höchster Evidenz

Die Fixkombination aus Clindamycin und BPO für leichte bis mittelschwere papulopustulöse Akne wird von der europäischen S3-Leitlinie mit dem höchsten Empfehlungsgrad bewertet.¹ Auch die NICE-Guideline empfiehlt sie als First-line-Therapie.²

- ✓ Evidenzbasierte Medizin auf höchstem Niveau
- ✓ Beste Chancen auf gute Behandlungserfolge und Adhärenz der Patienten




Der werbefreie **Patientenratgeber „Akne“** erläutert u.a. Hintergründe zum Krankheitsbild.

Alle gängigen Therapieoptionen werden wertungsfrei geschildert und praktische Hinweise zur behandlungsbegleitenden Hautpflege sind inbegriffen.

Jederzeit kostenfrei in gewünschter Stückzahl bestellbar über austria.kontakt@infectopharm.com



Den entscheidenden Schritt voraus sein



Durchschnittliche Reduktion der inflammatorischen Läsionen im Vergleich zur Ausgangssituation (***) $P \leq 0,001$ vs. Differin®¹⁴

Die Vorteile der Fixkombination Clindamycin + BPO¹⁸:

- beugt bakteriellen Resistenzentwicklungen vor.¹³
- zeigt einen **früheren Wirkeintritt** und erreicht schneller eine signifikante Reduktion der Akneläsionen als Zineryt®* (Erythromycin+Zink)¹⁵ oder Differin® (Adapalene)¹⁴
- ist **stärker antimikrobiell** wirksam als die Fixkombination Clindamycin+Tretinoin¹⁶
- wird von Patienten **besser vertragen** als Differin®¹⁴ oder Epiduo®* (Adapalene+BPO)¹⁷⁻¹⁹
- bekämpft die bakterielle Besiedlung⁹
- erzielt bei Patienten und behandelnden Ärzten eine **höhere Zufriedenheit mit der Behandlung** als Epiduo®¹⁸
- Verbessert die Lebensqualität bereits in den ersten Behandlungswochen¹⁸
- reduziert die übermäßige Talgproduktion, wodurch ein sichtbar verbessertes Hautbild entsteht⁹

* in Österreich nicht zugelassen

Clienzo 10 mg/g + 50 mg/g Gel. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 g Gel enthält 10 mg Clindamycin als Clindamycin-2-dihydrogenphosphat u. 50 mg Benzoylperoxid als wasserhaltiges Benzoylperoxid. Sonstige Bestandteile: Carbomer 980, Dimeticon, 3-Dodecyloxycarbonyl-2/3-sulfopropansäure-Dinatriumsalz, Natriumedetat (Ph.-Eur.), Glycerol (E 422), Poloxamer 182, Siliciumdioxid-Hydrat, Natriumhydroxid-Lösung 2N, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur topischen Behandlung der leichten bis mittelschweren Akne vulgaris, insb. mit entzündlichen Läsionen bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe, Lincomycin oder einen der sonstigen Bestandteile. Pharmakotherapeutische Gruppe: Aknemittel; Antiinfektiva zur Behandlung der Akne. ATC-Code: D10AF51. Packungsgrößen: 30 g. Inhaber der Zulassung: INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim. Rezept- und apothekenpflichtig. Stand 06/2021. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.