Anzupgo®
(Delgocitinib)

# ANZUPGO®
# KOMPAKT

# Das chronische Handekzem (CHE) kann für Ihre Patienten eine schwere Belastung sein

**80 %** schämten sich für das Aussehen ihrer Hände[1,*]

**75 %** litten unter Schlafstörungen[1,*]


**65 %** waren eingeschränkt im Alltag[1,*]

* Laut quantitativer Untersuchung aus den USA (2017-2018, 20 Patienten)

Weitere Informationen rund um CHE finden Sie auf **https://www.dermaworld.at/therapiegebiete/chronisches-handekzem/ueberblick**

## Anzupgo®

**Topischer Pan-JAK-Inhibitor[2] für alle* Formen des mittelschweren bis schweren chronischen Handekzems[3]**





* alle der damals definierten Subtypen aus den europäischen Leitlinien (Diepgen TL, et al. J Dtsch Dermatol Ges 2015;13:e1-22;)

Anzupgo® (Delgocitinib)

# Anzupgo®
## Schnelle Linderung[2]

**49,4 %** der Patienten erreichten HECSI-75 in Woche 16[2]





Grafik aus gepoolten Daten nach Bissonnette R, et al. The Lancet. 2024[2]

* Statistisch signifikant gegenüber Vehikel-Creme mit Korrektur auf multiples Testen, $p < 0{,}01$

** Statistisch signifikant gegenüber Vehikel-Creme ohne Korrektur auf multiples Testen, $p < 0{,}001$

# Langfristige Krankheitskontrolle[4,#]

Patienten mit HECSI-75 Ansprechen




Grafik adaptiert nach Gooderham M, et al. J Am Acad Dermatol. 2025.[4]


# Der Anteil der Patienten mit HECSI-75-Antwort und der Anteil der Patienten mit Reduktion des HESD für Juckreiz/Schmerz von ≥ 4 Punkten wurden bis zu Wo. 52 in DELTA 3 beibehalten. Auch die Reduktion des durchschnittlichen HECSI-Scores wurde langfristig beibehalten.[4]

HECSI: Der Handekzem-Schweregrad-Index (HECSI) ist ein vom Arzt angegebenes Ergebnis, mit dem das Ausmaß sowie der durchschnittliche Schweregrad (kein, leicht, mittelschwer, schwer) von sechs klinischen Anzeichen eines Handekzems (CHE) für jede der fünf verschiedenen Handregionen bewertet wird: Der Gesamt-HECSI wird durch die Bewertung des Ausmaßes des HE und des durchschnittlichen Schweregrads der klinischen Anzeichen für alle fünf Regionen berechnet. Der HECSI-75 steht für Patienten mit einer ≥ 75 %igen Verbesserung des HECSI gegenüber dem Ausgangswert.


# Von Anfang an unter Kontrolle:

## Juckreiz- und Schmerzlinderung ab Tag 1 bzw. 3[5]

### Juckreiz




### Schmerz





Grafiken adaptiert nach Bauer A, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2025[5]


* Statistisch signifikant gegenüber Vehikel-Creme, $p < 0{,}001$.

# Signifikante Verbesserung der Juckreiz- und Schmerzlinderung über 16 Wochen[5]

### Anteil der Patienten mit HESD-Juckreizreduktion ≥ 4 Punkte




### Anteil der Patienten mit HESD-Schmerzreduktion ≥ 4 Punkte





Grafiken adaptiert nach Bauer A, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2025[5]

**Die HECSI-75-Antwort und die HESD-Reduktion von Juckreiz/Schmerz von ≥ 4 wurde bis zu Woche 52 in DELTA 3 beibehalten.[4]**

* Statistisch signifikant gegenüber Vehikel-Creme, $p < 0{,}001$.

# Signifikante Überlegenheit von Anzupgo® vs. Alitretinoin[6,#]

**Signifikante Reduktion des HECSI an Woche 12 (primärer Endpunkt) sowie bis Woche 24 (sekundärer Endpunkt) vs. Alitretinoin**




Grafik adaptiert nach Giménez-Arnau AM, et al. The Lancet. 2025.[6]

# Gutes Sicherheitsprofil§ auch in der langfristigen Anwendung[2,4]

| | DELTA 1&2 (gepoolte Daten)[2] | | DELTA 3[4] |
|---|---|---|---|
| | Anzupgo® (*n* = 638) % | Vehikel-Creme (*n* = 321) % | Anzupgo® (*n* = 801) % |
| Alle unerwünschten Ereignisse (UE) | 45,6 | 47,7 | 61,8 |
| Schwerwiegende UE | 1,7 | 1,9 | 3,4 |
| UE, wahrscheinlich oder möglicherweise durch die zu untersuchende Creme bedingt | 5,3 | 7,5 | 3,4 |
| UE, die zum dauerhaften Therapieabbruch führten | 0,5 | 3,4 | 0,9 |

- Sicherheitsprofil auf Vehikel-Creme-Niveau[4]
- Kein Labormonitoring vorgeschrieben[3]

§ Das Sicherheitsprofil von Anzupgo® wurde in drei klinischen Studien bis zu 16 Wo. (DELTA 1 & 2) bzw. 52 Wo. (DELTA 3) untersucht. Das Sicherheitsprofil von Anzupgo® ist vergleichbar mit Vehikel-Creme in Wo. 16 in DELTA 1 & 2 und bis Wo. 52 in DELTA 3 konsistent.[2,4]

# Vollständiger Datensatz; fehlende Daten wurden mittels WOCF (Worst Obervation Carried Forward) ersetzt.

# Anzupgo®
## Einfach topisch, topisch einfach‡





Anzupgo® sollte 2-mal täglich dünn auf die betroffene Haut der Hände und Handgelenke aufgetragen werden, bis die Haut erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei ist.
Bei erneutem Auftreten von Symptomen des chronischen Handekzems (beginnender Schub) sollte die zweimal tägliche Behandlung der betroffenen Haut nach Bedarf wiederaufgenommen werden.[3]

Frei von Steroiden und Parabenen[3]

Nicht fettend, angenehm und leicht auftragbar[3,7,*]

## Hinweise zur Aufbewahrung[8]

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Das Arzneimittel nicht über 30 °C lagern. Nicht einfrieren.
- Das Arzneimittel darf nur bis auf dem auf der Tube und dem Umkarton nach „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum verwendet werden.
  Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
- Nach dem Öffnen 12 Monate haltbar.
- Dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgen. ApothekerInnen informieren über die korrekte Entsorgung, wenn das Arzneimittel nicht mehr verwendet wird.




Anzupgo®
(Delgocitinib)

# Jetzt Anzupgo®

- Schnelle Linderung[2,$] und langfristige Krankheitskontrolle[4,#]
- Einfache Anwendung[‡]
- Gutes Sicherheitsprofil[§] auch in der langfristigen Anwendung[2,4]




$ Statistisch signifikante Unterschiede in der Verbesserung des HESD für Juckreiz und Schmerz vs. Baseline wurden mit Anzupgo® im Vergleich zur Vehikel-Creme für eine mittlere Juckreizreduktion bereits an Tag 1 (0,75 vs. 0,32; $p < 0,001$) und für eine mittlere Schmerzreduktion bereits an Tag 3 (0,98 vs. 0,58; $p = 0,001$) beobachtet.[5]

\# Der Anteil der Patienten mit HECSI-75-Antwort und der Anteil der Patienten mit Reduktion des HESD für Juckreiz/Schmerz von ≥ 4 Punkten wurden bis zu Wo. 52 in DELTA 3 beibehalten.[4]

‡ Anzupgo® sollte zweimal täglich dünn auf die betroffene Haut der Hände und Handgelenke aufgetragen werden, bis die Haut erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei ist. Bei erneutem Auftreten von Symptomen des chronischen Handekzems (beginnender Schub) sollte die zweimal tägliche Behandlung der betroffenen Haut nach Bedarf wiederaufgenommen werden.[2]

§ Das Sicherheitsprofil von Anzupgo® wurde in drei klinischen Studien bis zu 16 Wo. (DELTA 1 & 2) bzw. 52 Wo. (DELTA 3) untersucht. Das Sicherheitsprofil von Anzupgo® ist vergleichbar mit Vehikel-Creme in Wo. 16 in DELTA 1 & 2 und bis Wo. 52 in DELTA 3 konsistent.[2,4]

* Basierend auf einer Marktforschungsstudie zu Patientenpräferenzen ($N = 74$), in der 55 % der Patienten angaben, dass die Anzupgo®-Cremeformulierung nicht fettig auf ihrer Haut sei und 64 % angaben, dass die Zeit bis zum Einziehen in die Haut akzeptabel sei.[7]

Anzupgo®
(Delgocitinib)



**Referenzen:**
**1.** Grant L, et al. Development of a Conceptual Model of Chronic Hand Eczema (CHE) Based on Qualitative Interviews with Patients and Expert Dermatologists. Adv Ther. 2020;37:692 – 706.

**2.** Bissonnette R, et al. Efficacy and safety of delgocitinib cream in adults with moderate to severe chronic hand eczema (DELTA 1 and DELTA 2): results from multicentre, randomised, controlled, double-blind, phase 3 trials. The Lancet. 2024; 404 (10451):461–473.

**3.** Fachinformation Anzupgo®, Stand Oktober 2025.

**4.** Gooderham M, et al. Long-term safety and efficacy of delgocitinib cream for up to 52 weeks in adults with Chronic Hand Eczema: results of the phase 3 open-label extension DELTA 3 trial following the DELTA 1 and 2 trials. J Am Acad Dermatol. 2025;S0190–9622(25)00424–4.

**5.** Bauer A, et al. Delgocitinib Cream Reduces Itch and Pain in Moderate to Severe Chronic Hand Eczema: Phase 3 DELTA 1 and 2 Pooled Analyses. Dermatol Ther (Heidelb). 2025 Dec 24. doi: 10.1007/s13555–025–01611–y. Epub ahead of print. PMID: 41442013.

**6.** Giménez-Arnau, AM et al. Efficacy and safety of topical delgocitinib cream versus oral alitretinoin capsules in adults with severe chronic hand eczema (DELTA FORCE): a 24–week, randomised, head-to-head, phase 3 trial. The Lancet. 2025: Volume 405, Issue 10490, 1676 –1688.

**7.** Bunick C, et al. Delgocitinib cream formulation development for Chronic Hand Eczema (CHE): insights from patient preference and skin penetration studies. Poster presented at EADV Spring Symposium, May 22–24, 2025. Prague.

**8.** Gebrauchsinformation Anzupgo®: Information für Anwender, Stand Oktober 2025.

**Fachkurzinformation Anzupgo® 20 mg/g Creme**

▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden.

**Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Ein Gramm der Creme enthält 20 mg Delgocitinib. *Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:* Ein Gramm der Creme enthält 10 mg Benzylalkohol (E 1519), 0,2 mg Butylhydroxyanisol (E 320) und 72 mg Cetylstearylalkohol. **Sonstige Bestandteile:** Citronensäure-Monohydrat (E 330), Natriumedetat, Salzsäure (E 507) (zur pH-Wert-Anpassung), dickflüssiges Paraffin, Macrogolcetylstearylether, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem chronischem Handekzem (CHE) bei Erwachsenen, bei denen topische Kortikosteroide nicht ausreichen oder nicht geeignet sind. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **Pharmakodynamische Eigenschaften:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere Dermatika, Mittel zur Behandlung der Dermatitis, mit Ausnahme von Kortikosteroiden, ATC-Code: D11AH11. **Inhaber der Zulassung:** LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dänemark. **Vertrieb:** LEO Pharma Ges.m.b.H., 1100 Wien. **Zulassungsnummern:** EU/1/24/1851/001, EU/1/24/1851/002 **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Stand der Information:** Oktober 2025

**Weitere Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Gewöhnungseffekten, pharmakologischen Eigenschaften und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

LEO Pharma Gesellschaft m.b.H.,
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Str. 2–4, Turm 9, Etage 7, 8, 9 • 1100 Wien

Anzupgo®
(Delgocitinib)

LEO Pharma Gesellschaft m.b.H.,
Gertrude-Fröhlich-Sandner-Str. 2-4, Turm 9, Etage 7, 8, 9 • 1100 Wien
© LEO 2026 Alle genannten Marken gehören der LEO Group.
LEO and the LEO Lion Design are registered trademarks of LEO Pharma A/S.
LEO® ©2026 LEO Pharma Inc. All rights reserved. September 2026 MAT-99952